重刊孫眞人備急千金要方卷第一

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

論大醫習業第一

凡欲爲大醫必須諳素問甲乙黃帝鍼經明堂流注十二經脉三部九候五臟六腑表裏孔穴本草藥對張仲景王叔和阮河南范東陽張苗靳邵等諸部經方又須妙解陰陽祿命諸家相法及灼龜五兆周易六壬並須精熟如此乃得爲大醫若不爾者如無目夜遊動致顛殞次須熟讀此方尋思妙理留意鑽研始可與言於醫道者矣又須涉獵群書何者若不讀五經不知有仁義之道不讀三史不知有古今之事不讀諸子覩事則不能默而識之不讀內經則不知有慈悲喜捨之德不讀莊老不能任眞體運則

南陵徐乃昌校勘經籍記

吉凶拘忌觸塗而生至於五行休王七耀天文並須探賾若能具而學之則於醫道無所滯礙盡善盡美矣

論大醫精誠第二

張湛曰夫經方之難精由來尚矣今病有內同而外異亦有內異而外同故五臟六腑之盈虛血脈榮衞之通塞固非耳目之所察必先診候以審之而寸口關尺有浮沉弦緊之亂俞穴流注有高下淺深之差肌膚筋骨有厚薄剛柔之異唯用心精微者始可與言於茲矣今以至精至微之事求之於至粗至淺之思豈不殆哉若盈而益之虛而損之通而徹之塞而壅之寒而冷之熱而溫之是重加其疾而望其生吾見其死矣故醫方卜筮藝能之難精者也既非神授何以得其幽微世有愚者讀方三年便謂天下

無病可治及治病三年乃知天下無方可用故學者必須
博極醫源精勤不倦不得道聽塗說而言醫道已了深自
誤哉凡大醫治病必當安神定志無欲無求先發大慈惻
隱之心誓願普救含靈之苦若有疾厄來求救者不得問
其貴賤貧富長幼妍蚩怨親善友華夷愚智普同一等皆
如至親之想亦不得瞻前顧後自慮吉凶護惜身命見彼
苦惱若己有之深心悽愴勿避嶮巇晝夜寒暑飢渴疲勞
一心赴救無作工夫形迹之心如此可爲蒼生大醫反此
則是含靈巨賊自古名賢治病多用生命以濟危急雖曰
賤畜貴人至於愛命人畜一也損彼益己物情同患況於
人乎夫殺生求生去生更遠吾今此方所以不用生命爲
藥者良由此也其䖟蟲水蛭之屬市有先死者則市而用

之不在此例只如雞卵一物以其混沌未分必有大段要急之處不得已隱忍而用之能不用者斯為大哲亦所不及也其有患瘡痍下痢臭穢不可瞻視人所惡見者但發慚愧悽憐憂恤之意不得起一念蔕芥之心是吾之志也

夫大醫之體欲得澄神內視望之儼然寬裕汪汪不皎不昧省病診疾至意深心詳察形候纖毫勿失處判針藥無得參差雖曰病宜速救要須臨事不惑唯當審諦覃思不得於性命之上率爾自逞俊快邀射名譽甚不仁矣又到病家縱綺羅滿目勿左右顧眄絲竹湊耳無得似有所娛珍羞迭薦食如無味醽醁兼陳看有若無所以爾者夫一人向隅滿堂不樂而況病人苦楚不離斯須而醫者安然懽娛傲然自得茲乃人神之所共恥至人之所不為斯蓋

醫之本意也夫爲醫之法不得多語調笑談謔諠譁道說是非議論人物衒燿聲名訾毀諸醫自矜己德偶然治瘥一病則昂頭戴面而有自許之貌謂天下無雙此醫人之膏肓也老君曰人行陽德人自報之人行陰德鬼神報之人行陽惡人自報之人行陰惡鬼神害之尋此二途陰陽報施豈誣也哉所以醫人不得恃己所長專心經略財物但作救苦之心於冥運道中自感多福者耳又不得以彼富貴處以珍貴之藥令彼難求自衒功能諒非忠恕之道志存救濟故亦曲碎論之學者不可恥言之鄙俚也

論治病略例第三

夫天布五行以植萬類人稟五常以爲五臟經絡腑輸陰陽會通玄冥幽微變化難極易曰非天下之至賾其孰能

與於此觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承家技始終循舊省病問疾務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎趺陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生固亦難矣此皆醫之深戒病者可不謹以察之而自防慮也古來醫人皆相嫉害扁鵲為秦太醫令李醯所害即其事也一醫處方不得使別醫和合脫或私加毒藥令人增疾漸以致困如此者非一特須慎之寧可不服其藥以任天真不得使愚醫相嫉賊人性命甚可哀傷

夫百病之本有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通賁豚上氣欬逆嘔吐黃疸消渴留

飲癖食堅積癥瘕驚邪癲癇鬼疰喉痹齒痛耳聾目盲金
瘡踒折癰腫惡瘡痔瘻癭瘤男子五勞七傷虛乏羸瘦女
子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此皆大略宗兆其
間變動枝葉各依端緒以取之又有冷熱勞損傷飽房勞
驚悸恐懼憂恚怵惕又有產乳落胎墮下瘀血又有貪餌
五石以求房中之樂此皆病之根源為患生諸枝葉也不
可不知其本末但向醫說男女長幼之病有半與病源相
附會者便可服藥也男子者衆陽所歸常居於燥陽氣遊
動強力施泄便成勞損損傷之病亦以衆矣若比之女人
則十倍易治凡女子十四已上則有月事月事來日得風
冷濕熱四時之病相協者皆自說之不爾與治誤相觸動
更增困也處方者亦應問之凡用藥皆隨土地所宜江南

嶺表其地暑濕其人肌膚薄脆腠理開疏用藥輕省關中
河北土地剛燥其人皮膚堅硬腠理閉塞用藥重複世有
少盛之人不避風濕觸犯禁忌暴竭精液雖得微疾皆不
可輕以利藥下之一利大重竭其精液困滯著牀動經年
月也凡長宿病宜服利湯不須盡劑候利之足則止病源
未除者於後更合耳稍有氣力堪盡劑則不論也病源須
服利湯取除者服利湯後宜將丸散時時助之
凡病服利湯得瘥者此後慎不中服補湯也若得補湯病
勢還復成也更重瀉之則其人重受弊也若初瘥氣力未
甚平復者但消息之須服藥者當以平藥和之夫常患之
人不妨行走氣力未衰欲將補益冷熱隨宜丸散者可先
服利湯瀉除胸腹中壅積痰實然後可服補藥也夫極虛

勞瘵服補湯者不過一二劑即止若治風病應服治風湯者皆非三五劑可知也自有滯風洞虛即服十數劑乃至百餘日可瘥也故曰實即瀉之虛則補之

夫二儀之內陰陽之中唯人最貴人者禀受天地中和之氣法律禮樂莫不由人人始生先成其精精成而腦髓生頭圓法天足方象地眼目應日月五臟法五星六腑法六律以心爲中極大腸長一丈二尺以應十二時小腸長二丈四尺以應二十四氣身有三百六十五絡以應一歲人有九竅以應九州天有寒暑人有虛實天有刑德人有愛憎天有陰陽人有男女月有大小人有長短所以服食五穀不能將節冷熱鹹苦更相振觸共爲攻擊變成疾病凡醫診候固是不易又問而知之別病深淺名曰巧醫仲景

曰凡欲和湯合藥針灸之法宜應精思必通十二經脈辨三百六十孔穴榮衛氣行知病所在宜治之法不可不通古者上醫相色色脈與形不得相失黑乘赤者死赤乘青者生中醫聽聲聲合五音火聞水聲煩悶干驚木聞金聲恐畏相刑脾者土也生育萬物迴助四傍善者不見死則歸之太過則四肢不舉不及則九竅不通六識閉塞猶如醉人四季運轉終而復始下醫診脈知病源由流轉移動四時逆順相害相生審知臟腑之微此乃為妙也

論診候第四

夫欲理病先察其源候其病機五臟未虛六腑未竭血脈未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全

夫診候之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調均氣血未亂精取其脉知其逆順非其時不用也深察三部九候而明告之古之善爲醫者上醫醫國中醫醫人下醫醫病又曰上醫聽聲中醫察色下醫診脉又曰上醫醫未病之病中醫醫欲病之病下醫醫已病之病若不加心用意於事混淆即病者難以救矣何謂三部寸關尺也上部爲天肺也中部爲人脾也下部爲地腎也何謂九候部各有三合爲九候上部天兩額動脉主頭角之氣也上部地兩頰動脉主口齒之氣也上部人耳前動脉主耳目之氣也中部天手太陰肺之氣也中部地手陽明胃中之氣也中部人手少陰心之氣也下部天足厥陰肝之氣也下部地足少陰腎之氣也下部人足太陰脾

之氣也合為九候夫形盛脉細少氣不足以息者死形瘦
脉大胷中多氣者死形氣相得者生參五不調者病三部
九候皆相失者死愚醫不通三部九候及四時之經或用
湯藥倒錯針灸失度順方治病更增他疾遂致滅亡哀哉
蒸民枉死者半可謂世無良醫為其解釋經說地水火風
和合成人凡人火氣不調舉身蒸熱風氣不調全身強直
諸毛孔閉塞水氣不調身體浮腫氣滿喘粗土氣不調四
肢不舉言無音聲火去則身冷風止則氣絕水竭則無血
土散則身裂然愚醫不思脉道反治其病使藏中五行共
相尅切如火熾燃重加其油不可不慎凡四氣合德四神
安和一氣不調百病一生四神動作四百四病同時俱發
又云一百一病不治自愈一百一病須治而愈一百一病

雜治難愈一百一病其死不治

張仲景曰欲療諸病當先以湯蕩滌五臟六腑開通諸脉治道陰陽破散邪氣潤澤枯朽悅人皮膚益人氣血水能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次當用散散能逐邪風氣濕痺表裏移走居無常處者散當平之次當用丸丸藥者能逐風冷破積聚消諸堅癖進飲食調和榮衛能參合而行之者可謂上工故曰醫者意也又曰不須汗而彊汗之者出其津液枯竭而死須汗而不與汗之者使諸毛孔閉塞令人悶絕而死又不須下而彊下之者令人開腸洞泄不禁而死須下而不與下之者使人心內懊憹脹滿煩亂浮腫而死又不須灸而彊與灸者令人火邪入腹干錯五臟重加其煩而死須灸而不與灸之者令人冷

結重凝久而彌固氣上衝心無地消散病篤而死

黃帝問曰淫邪泮衍柰何岐伯對曰正邪從外襲內而未有定舍反淫於藏不得定處與榮衛俱行而與魂魄飛揚使人臥不得安而喜夢也凡氣淫於腑則有餘於外不足於內氣淫於臟則有餘於內不足於外問曰有餘不足有形乎對曰陰盛則夢涉大水而恐懼陽盛則夢大火而燔灼陰陽俱盛則夢相殺毀傷上盛則夢飛揚下盛則夢墮墜甚飽則夢與（巢源云夢行）甚飢則夢取（巢源云夢臥）肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢恐懼哭泣心氣盛則夢善笑及恐畏脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉腎氣盛則夢腰脊兩解而不屬凡此十二盛者至而瀉之立已厥氣客於心則夢見丘山煙火客於肺則夢飛揚見金鐵之器奇物客於肝則夢

夢見山林樹木客於脾則夢見丘陵大澤壞屋風雨客於腎則夢見臨淵沒居水中客於膀胱則夢見遊行客於胃則夢見飲食客於大腸則夢見田野客於小腸則夢見聚邑街衢客於膽則夢見鬬訟自刳客於陰器則夢交接鬬內客於項則夢見斬首客於脛則夢見行走而不能前進及池渠穽窌中居客於股則夢見禮節拜跪客於胞䐈則夢見溲溺便利凡此十五不足者至而補之立已善診候者亦可深思此意乃盡善盡美矣

史記曰病有六不治驕恣不論於理一不治也輕身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并藏氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也生候尚存形色未改病未入腠裏針藥及時能將節調理委

以良醫療病無不愈

論處方第五

夫療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以蠱毒藥癰腫瘡瘤以瘡瘤藥風濕以風濕藥風勞氣冷各隨其所宜雷公云藥有三品病有三階藥有甘苦輕重不同病有新久寒溫亦異重熱膩滑鹹酢藥石飲食等於風病爲治餘病非對輕冷粗澀甘苦藥草飲食等於熱病爲治餘病非對輕熱辛苦淡藥飲食等於冷病爲治餘病非對其大綱畧顯其源流自餘覩狀可知臨事制宜當識斯要

藥對曰夫衆病積聚皆起於虚虚生百病積者五臟之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虚而

勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善爲醫者皆自採藥
審其體性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚則盛勢
已歇今之爲醫不自採藥且不委節氣早晚只共採取用
以爲藥又不知冷熱消息分兩多少徒有療病之心永無
必愈之效此實浮惑聊復審其冷熱記其增損之主耳
虛勞而苦頭痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參虛而
不安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃
牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾
乳棘刺肉蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多
忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒紫石英沙參小草
冷則用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱無
用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子

柏子人虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛而身彊腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃耆虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣加生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞肶胵虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而痢白加厚朴諸藥無有一一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊叙增損之一隅入處方者宜準此

論用藥第六

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經

中藥一百二十種為臣主養性以應人有毒無毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經

下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久
服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經

三品合三百六十五種法三百六十五度每一度應一日
以成一歲倍其數合七百三十名也

凡藥有君臣佐使以相宣攝合和者宜用一君二臣三佐
五使又可一君三臣九佐使也

又有陰陽配合子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者
有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相
殺者凡此七情合和之時用意視之當用相須相使者良
勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿
合用也又有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有
毒無毒陰乾曝乾採造時月生熟土地所出真偽陳新並

王蓀釋名弘景
天名精釋名本
注
思肖釋名本
經

各有法實相使相畏七情列之如左處方之日宜深究之

○玉石上部

玉泉畏款冬花　玉屑惡鹿角

丹砂惡磁石畏鹹水　曾青畏菟絲子

石膽水英為使畏牡桂菌桂芫花辛夷白薇　雲母澤瀉為使畏鮀魚及流水惡徐長卿

鍾乳蛇床子菟絲子為使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草

朴消畏麥句薑　消石火為使惡苦參苦菜畏女菀

芒消石韋為使惡麥句薑　礬石甘草為使惡牡蠣

滑石石韋為使惡曾青　白石英惡馬目毒公

紫石英長石為使畏扁青附子不欲蛇甲黃連麥句薑

赤石脂惡大黃畏芫花　黃石脂曾青為使惡細辛畏蜚蠊扁青附子

白石脂鷰糞為使惡松脂畏黃芩　太一餘糧杜仲為使畏鐵落菖蒲貝母

○玉石中部

水銀 畏磁石　殷孽 惡防己 畏朮

孔公孽 木蘭為使 惡細辛　凝水石 畏地榆 解巴豆毒

陽起石 桑螵蛸為使 惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮 畏菟絲子

石膏 雞子為使 惡莽草毒公　磁石 柴胡為使 畏黃石脂 惡牡丹莽草

玄石 惡松脂柏子人菌桂　理石 滑石為使 畏麻黃

○玉石下部

青琅玕 得水銀良 畏雞骨 殺錫毒　礜石 得火良 棘針為使 惡虎掌毒公鶩屎細辛 畏水

特生礜石 得火良 畏水　方解石 惡巴豆

代赭 畏天雄　大鹽 漏蘆為使

○草藥上部

六芝 薯蕷為使 得髮良 惡常山 畏扁青茵陳　天門冬 垣衣地黃為使 畏曾青

赤蛤本綱四十八
卷已馬刀下出

麥門冬 地黃車前爲使惡款冬苦瓠畏苦參青蘘
朮 防風地榆爲使
女萎萎蕤 畏鹵鹹
乾地黃 得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑
菖蒲 秦艽秦皮爲使惡地膽麻黃
澤瀉 畏海蛤文蛤
遠志 得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠蜚蠊藜蘆齊蛤
薯蕷 紫芝爲使惡甘遂
菊花 朮枸杞根桑根白皮爲使
甘草 朮乾漆苦參爲使惡遠志反甘遂大戟芫花海藻
人參 茯苓爲使惡溲疏反藜蘆
石斛 陸英爲使惡凝水石巴豆畏白殭蠶雷丸
牛膝 惡螢火龜甲陸英畏白前
獨活 蠡實爲使
細辛 曾青棗根爲使惡狼毒山茱萸黃耆畏滑石消石反藜蘆
柴胡 半夏爲使惡皂莢畏女菀藜蘆
菴閭子 荊子薏苡人爲使惡細辛乾薑
菥蓂子 得荊子細辛良惡乾薑苦參
龍膽 貫衆爲使惡防葵地黃
菟絲子 得酒良薯蕷松脂爲使惡雚菌
巴戟天 覆盆子爲使惡朝生雷丸丹參

蒺藜子烏頭為使　防風惡乾薑藜蘆白斂芫花殺附子毒
絡石杜仲牡丹為使惡鐵落畏菖蒲貝母　沙參惡防己反藜蘆
丹參畏鹹水反藜蘆　天名精垣衣為使
黃連黃芩龍骨理石為使惡菊花芫花玄參白鮮皮畏款冬勝烏頭解巴豆毒
決明子著實為使惡大麻子　芎藭白芷為使
續斷地黃為使惡雷丸　黃耆惡龜甲
杜若得辛夷細辛良反柴胡前胡　蛇牀子惡牡丹巴豆貝母
茜根畏鼠姑　飛廉得烏頭良惡麻黃
薇銜得秦皮良　五味子蓯蓉為使惡萎蕤勝烏頭

○草藥中部

當歸惡䕡茹畏菖蒲海藻牡蒙　秦艽菖蒲為使
黃芩山茱萸龍骨為使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆　乾薑秦椒為使惡黃連黃芩天鼠糞殺半夏莨菪毒

芍藥雷丸為使惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊反藜蘆

藁本惡䕡茹　麻黃厚朴為使惡辛夷石韋

葛根殺野葛巴豆百藥毒　前胡半夏為使惡皂莢畏藜蘆

貝母厚朴白薇為使惡桃花畏秦芁礜石莽草反烏頭

栝蔞枸杞為使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭　玄參惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆

苦參玄參為使惡貝母漏蘆菟絲子反藜蘆　石龍芮大戟為使畏蛇蛻皮吳茱萸

石韋滑石杏人為使得菖蒲良　狗脊萆薢為使惡敗醬

萆薢薏苡為使畏葵根大黃柴胡牡蠣前胡　瞿麥蘘草牡丹為使惡桑螵蛸

白芷當歸為使惡旋復花　紫菀款冬為使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳

白鮮皮惡桑螵蛸桔梗茯苓萆薢　白薇惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆大棗山茱萸

紫參畏辛夷　仙靈脾薯蕷為使

款冬花杏人為使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩黃連青葙

牡丹畏菟絲子　防己殷孽爲使惡細辛畏萆薢殺雄黄毒

女菀畏鹵鹹　澤蘭防己爲使

地榆得髮良惡麥門冬　海藻反甘草

○草藥下部

大黄黄芩爲使　桔梗節皮爲使畏白芨龍膽龍眼

甘遂瓜蒂爲使惡遠志反甘草　葶藶榆皮爲使得酒良惡殭蠶石龍芮

芫花決明爲使反甘草　澤漆小豆爲使惡薯蕷

大戟反甘草　鉤吻半夏爲使惡黄芩

藜蘆黄連爲使反細辛芍藥五參惡大黄　天雄遠志爲使惡腐婢

烏頭烏喙莽草爲使反半夏栝樓貝母白斂白及惡藜蘆

附子地膽爲使惡蜈蚣畏防風甘草黄耆人參烏韭大豆

貫衆雚菌爲使　虎掌蜀漆爲使畏莽草

半夏射干為使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭
蜀漆栝樓為使惡貫衆　恒山畏玉札
狼牙蕪荑為使惡棗肌地榆　白歛代赭為使反烏頭
白及紫石英為使惡理石李核人杏核人　雚菌得酒良畏雞子
䕡茹甘草為使惡麥門冬　藎草畏鼠婦
夏枯草土瓜為使　狼毒大豆為使惡麥句薑
鬼臼畏垣衣

○木藥上部

茯苓茯神馬蔺為使惡白歛畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲
栢子人牡蠣桂心瓜子為使畏菊花羊蹄諸石麪麴
杜仲惡蛇蜕玄參　乾漆半夏為使畏雞子
蔓荊子惡烏頭石膏　牡荊實防風為使惡石膏

五加皮 遠志為使畏蛇蛻玄參　黃蘗 惡乾漆

辛夷 芎藭為使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏黃環

酸棗人 惡防己　槐子 天雄景天為使

○木藥中部

厚朴 乾薑為使惡澤瀉寒水石消石　山茱萸 蓼實為使惡桔梗防風防己

吳茱萸 蓼實為使惡丹參消石白堊畏紫石英　秦皮 大戟為使惡吳茱萸

占斯 解狼毒毒　梔子 解躑躅毒

秦椒 惡栝蔞防葵畏雌黃　桑根白皮 續斷桂心麻子為使

○木藥下部

黃環 鳶尾為使惡茯苓防己　石南 五加皮為使

巴豆 芫花為使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆殺斑貓毒　蜀椒 杏人為使畏款冬

欒華 決明為使　雷丸 荔實厚朴為使惡葛根

溲疏 漏蘆為使

皂莢 栢子為使惡麥門冬 畏空青人參苦參

○獸上部

龍骨 得人參牛黃良畏石膏

龍角 畏乾漆蜀椒理石

牛黃 人參為使惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝

白膠 得火良畏大黃

阿膠 得火良畏大黃

○獸中部

犀角 松脂為使惡雚菌雷丸

羖羊角 菟絲子為使

鹿茸 麻勃為使

鹿角 杜仲為使

○獸下部

麋脂 畏大黃惡甘草

○蟲魚上部

蜜蠟 惡芫花齊蛤

蜂子 畏黃芩芍藥牡蠣

牡蠣 貝母為之使得甘草牛膝遠志蛇牀子良惡麻黃吳茱萸辛夷

桑螵蛸 畏旋覆花

海蛤 蜀漆為使畏狗膽甘遂芫花

龜甲 惡沙參蜚蠊

○蟲魚中部

伏翼 莧實雲實為使

蝟皮 得酒良畏桔梗麥門冬

蜥蜴 惡硫黃斑猫蕪荑

露蜂房 惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

䗪蟲 畏皂莢菖蒲

蠐螬 蜚蠊為使惡附子

鼈甲 惡礬石

鮀魚甲 蜀漆為使畏狗膽甘遂芫花

烏賊魚骨 惡白斂白及

蟹 殺莨菪毒漆毒

天鼠糞 惡白斂白薇

○蟲魚下部

蛇蛻 畏磁石及酒

蜣蜋 畏羊角石膏

斑猫 馬刀為使 畏巴豆 丹參 空青 惡膚青

地膽 惡甘草

馬刀 得水良

○菓上部

大棗 殺烏頭毒

○菓下部

杏人 得火良 惡黄耆 黄芩 葛根 解錫 胡粉毒 畏蘘草

○菜上部

冬葵子 黄芩為使

○菜中部

葱實 解藜蘆毒

○米上部

麻蕡麻子 畏牡蠣 白微 惡茯苓

○米中部

大豆及黃卷 惡五參龍膽得前胡烏喙杏人牡蠣良殺烏頭毒

大麥 食蜜爲使

醬 殺藥毒火毒

右一百九十七種有相制使其餘皆無故不備錄

或曰古人用藥至少分兩亦輕瘥病極多觀君處方非不煩重分兩亦多而瘥病不及古人者何也答曰古者日月長遠藥在土中自養經久氣味真實百姓少欲禀氣中和感病輕微易爲醫療今時日月短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以爲醫病輕用藥須少痾重用藥即多此則醫之一隅何足怪也又古之醫者自解採取陰乾曝乾皆悉如法用藥必依土地所以治十得九今之醫者但知診脉處方不委採藥時節至於出處土地新陳虛實一皆不

悉所以治十不得五六者寔由於此夫處方者常須加意重複用藥藥乃有力若學古人徒自誤耳今方來學者須詳熟之

凡紫石英白石英朱砂雄黃硫黃等皆須光明映徹色理鮮淨者為佳不然令人身體乾燥發熱口乾而死

凡草石藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾治病不愈

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃呉茱萸皆欲得陳久者良其餘惟須精新也

論合和第七

問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何答曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須燒鍊炮炙生熟有定一如後法順方

若有禍逆之者殃或須皮去肉或去皮須肉或須根莖或須花實依方鍊治極令淨潔然後升合秤兩勿令參差藥有相生相殺氣力有強有弱君臣相理佐使相持若不廣通諸經則不知有好有惡或醫自以意加減不依方分使諸草石強弱相欺入人腹中不能治病更加鬬爭草石相反使人迷亂力甚刀劍若調和得所雖未能治病猶得安利五臟於病無所增劇

例曰諸經方用藥所有熬鍊節度皆脚注之今方則不然於此篇具條之更不煩方下別注也

凡藥治擇熬炮訖然後秤之以充用不得生秤

凡用石藥及玉皆碎如米粒綿裹內湯酒中

凡鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極細

凡銀屑以水銀和成泥

凡礬石赤泥團之入火半日乃熟可用仍不得過之不鍊
生入藥使人破心肝
凡朴消礬石燒令汁盡乃入丸散芒消朴消皆絞湯訖內
汁中更上火兩三沸烊盡乃服
凡湯中用丹砂雄黃者熟末如粉臨服內湯中攪令調和
服之
凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子之類是也用細核物亦
打碎山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正
爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩
亦完用之
凡橘皮吳茱萸椒等入湯不㕮咀
凡諸菓實人皆去尖及雙人者湯柔撻去皮仍切之用梔

子者去皮用蒲黃者湯成下

凡麥門冬生薑入湯皆切三擣三絞取汁湯成去滓下之煑五六沸依如升數不可共藥煑之一法薄切用

凡麥門冬皆微潤抽去心

凡麻黃去節先別煑兩三沸掠去沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩寸斬之小草瞿麥五分斬之細辛白前三分斬之膏中細剉也

凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散者先以碪搥極打令碎乃入臼不爾擣不熟入酒亦然

凡桂厚朴杜仲秦皮木蘭輩皆削去上虛軟甲錯取裏有味者秤之茯苓猪苓削除黒皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫菀洗去土暴乾乃秤之薤白葱白除青令

盡莽草石南茵芋澤蘭剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連
皆除根毛石韋辛夷拭去毛辛夷又去心蜀椒去閉口者
及目用大棗烏梅皆去核用鬼箭削取羽皮
凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者
凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉暖酒漬經一宿漉出暴
微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣
之須臾悉盡極易碎
凡用甘草厚朴枳實石南茵芋藜蘆皂莢之類皆炙之而
枳實去穰藜蘆去頭皂莢去皮子
凡用椒實微熬令汗出則有勢力
凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻灰炮令微拆
削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削去皮乃

剉之宜理破作七八片

凡半夏熱湯洗去上滑一云十洗四破乃秤之以入湯若膏酒丸散皆塘灰炮之

凡巴豆去皮心膜熬令紫色桃人杏人葶藶胡麻諸有脂膏藥皆熬黃黑別搗令如膏指攤視泯泯爾乃以向成散稍稍下臼中合研搗令消散乃復都以輕絹篩之須盡又內臼中依法搗數百杵也湯膏中雖有生用者并搗破

凡用麥蘖麴末大豆黃卷澤蘭蕪荑皆微炒乾漆炒令煙斷用烏梅入丸散者熬之用熟艾者先炒細擘合諸藥搗令細散不可篩者內散中和之

凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鱉鯪鯉等甲皮肉骨角筋鹿茸等皆炙之蛇蛻皮微炙

凡用斑猫等諸蟲皆去足翅微熬用桑螵蛸中破炙之牡
蠣熬令黃色殭蠶蜂房微炒之
凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黄須末如粉臨服內
湯中攪令調和服之
凡丸散用膠先炙使通體沸起燥乃可擣有不沸處更炙
之斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢內汁
中更上火兩三沸令烊
凡用蜜先火煎掠去沫令色微黃則丸經久不壞掠之多
少隨蜜精粗遂至大稠於丸彌佳
凡丸中用蠟烊投少蜜中攪調以和藥
凡湯中用飴糖皆湯成下諸湯用酒者皆臨熟下之
凡藥有宜丸者宜散者宜湯者宜酒漬者宜膏煎者亦有

合和

一物兼宜者亦有不入湯酒者並隨其藥性不得違之其不
宜湯酒者列之如左

朱砂熟入湯　雌黃　雲母　陽起石入酒　礬石入酒
硫黃入酒　鍾乳入酒　孔公孽入酒　礜石入酒　銀屑
白堊　銅鏡鼻　胡粉　鈆丹　鹵鹹入酒
石灰入酒　藜灰

右石類一十七種

野葛　狼毒　毒公　鬼臼　莽草
蒴藋入酒　巴豆　躑躅入酒　皂莢入酒　雚菌
藜蘆　蔄茹　貫衆入酒　蕪荑　雷丸
狼牙　鳶尾　蒺藜入酒　女菀　枲耳
紫葳入酒　薇銜入酒　白及　牡蒙　飛廉

蛇銜　占斯　辛夷　石南入酒　楝實

虎杖入酒單漬　虎掌　蓄根　羊桃入酒　麻勃

苦瓠　瓜蒂　陟釐　狼跋子入酒　雲實

槐子入酒　地膚子　蛇牀子入酒　青葙子　茺蔚子

王不留行　菥蓂子　菟絲子入酒

右草木之類四十八種

蜂子　蜜蠟　白馬莖　狗陰　雀卵

雞子　雄鵲　伏翼　鼠婦　樗雞

螢火　蠮螉[illegible]　蜈蚣　蜥蜴

斑猫　芫青　亭長　蛇膽　蝱

蜚蠊　螻蛄　馬刀　赭魁　蝦蟇

蝟皮　生鼠　生龜入酒　蝸牛　諸鳥獸入酒

人[illegible]術

蟲魚禽獸骨髓膽血屎溺

右蟲獸之類二十九種

古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍爲一銖六銖爲一分四分爲一兩十六兩爲一斤此則神農之稱也吳人以二兩爲一兩隋人以三兩爲一兩今依四分爲一兩稱爲定方家凡云等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩三種五種皆悉分兩同等耳凡丸散云若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干之分兩也假令日服三方寸匕須瘥止是三五兩藥耳凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一準如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度錢匕者以大錢上全抄之若云半錢匕者則是一錢抄取一邊爾並用五銖錢也錢五

匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者
四刀圭也十撮為一勺兩勺為一合以藥升分之者謂藥
有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一
寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調
耳今人分藥不復用此

凡丸藥有云如細麻大者即胡麻也不必扁扁但令較略
大小相稱爾如黍粟者亦然以十六黍為一大豆也如麻
子者即今大麻子准三細麻也如胡豆者今青斑豆也以
二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大
麻子准之如大豆者以二小豆准之如梧桐子者以二大
豆准之一方寸匕散以蜜和得如梧桐子十丸為定如彈
丸及雞子黃者以十梧桐子准之

八口秘

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚枳實若干枚者去穰畢以一分準二枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩云乾薑一累者以半兩爲正本草云一兩爲正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正椒一升三兩爲正呉茱萸一升五兩爲正菟絲子一升九兩爲正菴䕡子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤準皆取平升爲正

凡方云桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘草一尺者重二兩爲正云某草一束者重三兩爲正一把者重二兩爲

正
凡云蜜一斤者有七合猪膏一斤者一升二合
凡湯酒膏藥舊方皆云㕮咀者謂秤畢擣之如大豆又使
吹去細沫此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤
兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末
而片粒調和也凡云末之者謂擣篩如法也
凡丸散先細切曝燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方
所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切曝乾獨擣令
偏碎更出細擘曝乾若值陰雨可微火烘之既燥小停冷
乃擣之凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為
正其湯酒中不須如此
凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸即易熟若篩散草藥用

輕踈絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸藥
者
凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色
理和同爲佳
凡煑湯當取井花水極令靜潔升斗分量勿使多少煑之
調和候火用心一如鍊法
凡煑湯用微火令小沸其水數依方多少大畧二十兩藥
用水一斗煑取四升以此爲率皆絞去滓而後酌量也然
則利湯欲生少水而多取汁者爲病須快利所以少水而
多取汁補湯欲熟多水而少取汁者爲病須補益是以多
水而少取汁好詳視之不得令水多少湯熟用新布兩人
以尺木絞之澄去𣻸濁分再服三服者第一第二服以紙

覆令密勿令洩氣欲服以銅器於熱湯上暖之勿令器中有水氣

凡漬藥酒皆須切細生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微擣更漬飲之亦可散服

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人當依此用皆應先暴令燥也

凡合膏先以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云晬時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使匝匝沸乃下之取沸靜良久乃止寧欲小生其中有薤白者以兩頭微焦黃爲候有白芷附子者亦令小黃色爲度猪肪皆勿令經水臘月

者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦堪酒煑飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也

凡膏中有雄黄朱砂輩皆別擣細研如麫須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝彊勿使沉聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾

凡擣藥法燒香灑掃淨潔不得雜語喧呼當使童子擣之務令細熟杵數可至千萬杵過多為佳

凡合腎氣署預及諸大補五石大麝香丸金牙散大酒煎膏等合時煎時並勿令婦人小兒產母喪孝痼疾六根不具足人及雞犬六畜等見之大忌切宜慎之其續命湯麻黄等諸小湯不在禁忌之限比來田野下里家因市得藥

隨便市上雇人擣合非止諸不如法至於石斛菟絲子等難擣之藥費人功力賃作擣者隱主悉盜棄之又為塵埃穢氣入藥中羅篩粗惡隨風飄揚衆口嘗之衆鼻齅之藥之精氣一切都盡與朽木不殊又復服餌不能盡如法服盡之後反加虛損遂謗醫者處方不效夫如此者非醫之咎自緣發意甚誤宜熟思之

論服餌第八

若用毒藥治病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去為度病在胸膈已上者先食而後服藥病在心腹已下者先服藥而後食病在四肢血脈者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜

凡服丸散不云酒水飲者本方如此是可通用也

凡服利湯欲得侵早凡服湯欲得稍熱服之即易消下不吐若冷則吐嘔不下若太熱即破人咽喉務在用意湯必須澄清若濁令人心悶不解中間相去如步行十里久再服若太促數前湯未消後湯來衝必當吐逆仍問病者腹中藥消散乃可進服

凡服湯法大約皆分爲三服取三升然後乘病人穀氣彊進一服最須多次一服漸少後一服最須少如此即甚安穩所以病人於後氣力漸微故湯須漸少凡服補湯欲得服三升半晝三夜一中間間食則湯氣溉灌百脉易得藥力凡服湯不得太緩太急也又須左右仰覆卧各一食頃即湯勢徧行腹中又於室中行皆可一百步許一日勿出外即大益凡服湯三日常忌酒緣湯忌酒故也凡服治風

湯第一服厚覆取汗若得汗即須薄覆勿令大汗中間亦須間食不爾令人無力更益虛羸

凡丸藥皆如梧桐子大補者十丸爲始從一服漸加不過四十丸過亦損人云一日三度服欲得引日多時不闕藥氣漸漬熏蒸五臟積久爲佳不必頓服早盡爲善徒棄名藥獲益甚少凡人四十已下有病可服瀉藥不甚須服補藥必若有所損不在此限四十已上則不可服瀉藥須服補藥五十已上四時勿闕補藥如此乃可延年得養生之術耳其方備在第二十七卷中素問曰實即瀉之虛即補之不虛不實以經調之此其大略也凡有臟腑積聚無問少長須瀉則瀉凡有虛損無問少長須補即補以意量度而用之

凡服痔漏疳䘌等藥皆愼猪雞魚油等味至老
凡服瀉藥不過以利爲度愼勿過多令人下利無度大損
人也
凡諸惡瘡瘥後皆百日愼口味不爾即瘡發也
凡服酒藥欲得使酒氣相接無得斷絶絶則不得藥力多
少皆以知爲度不可令至醉及吐則大損人也
凡服藥皆斷生冷酢滑猪犬雞魚油麪蒜及菓實等其大
補丸散切忌陳臭宿滯之物有空青忌食生血物天門冬
忌鯉魚白朮忌桃李及雀肉葫荽大蒜青魚鮓等物地黃
忌蕪荑甘草忌菘菜海藻細辛忌生菜菟絲子忌兎肉牛
膝忌牛肉黃連桔梗忌猪肉牡丹忌葫荽藜蘆忌狸肉半
夏菖蒲忌飴糖及羊肉恒山桂心忌生葱生菜商陸忌犬

肉茯苓忌醋物梔子人忌濕麪巴豆忌蘆笋羹及猪肉醬
甲忌莧菜

凡服藥忌見死尸及產婦穢污觸之兼及忿怒憂勞

凡餌湯藥其粥食肉菜皆須大熟熟即易消與藥相宜若生則難消復損藥力仍須少食菜及硬物於藥為佳亦少進鹽醋乃善亦不得苦心用力及房室喜怒是以治病用藥力惟在食治將息得力太半於藥有益所以病者務在將息節慎節慎之至可以長生豈惟愈病而已

凡服瀉湯及諸丸散酒等至食時須食者皆先與一口冷醋飯須臾乃進食為佳

凡人忽遇風發身心頑痺或不能言有如此者當服大小續命湯及西州續命排風越婢等湯於無風處密室之中

日夜四五服勿計劑數多少亦勿慮虛常使頭面手足腹
背汗出不絶爲佳服湯之時湯消即食粥粥消即服湯亦
少與羊肉臛將補若風大重者相續五日五夜服湯不絶
即經二日停湯以羹臛自補將息四體若小差即當停藥
漸漸將息如其不差當更服湯攻之以差爲度

凡患風服湯非得大汗其風不去所以諸風方中皆有麻
黄至如西州續命即用八兩越婢六兩大小續命或用一
兩三兩四兩故知非汗不差所以治風非密室不得輙服
湯藥徒自誤耳[illegible]加增未見損減矣

凡人五十已上[illegible]更生愼勿用五石也四時
常以平旦服一二升暖飲終身勿絶及一時勿食蒜油魚
[illegible]牛馬雞鵝鴨等肉即無病矣

論藥藏第九

存不忘亡安不忘危大聖之至教求民之瘼恤民之隱賢人之用心所以神農鳩集百藥黃帝纂録鍼經皆備預之常道也且人疴瘵多起倉卒不與人期一朝嬰已豈遑知救想諸好事者可貯藥藏用以備不虞所謂起心雖微所救惟廣見諸出祿之家有善養馬者尚貯馬藥數十斤不見養身者有蓄人藥一錙銖以此類之極可愧矣貴畜而賤身誠可羞矣傷人乎不問馬此言安用哉至如人或有公私使命行遊邊隅地既不毛藥物焉出忽逢瘴癘素不資貯無以救療遂拱手待斃以致夭歿者斯為自致豈是枉横何者既不能深心以自衛一朝至此何歎惜之晚哉故置藥藏法以防危殆云爾

石藥灰土藥水藥根藥莖藥葉藥花藥皮藥子藥五穀五菓五菜諸獸齒牙骨角蹄甲皮毛尿屎等藥酥髓乳酪醍醐石蜜沙糖飴糖酒醋膠麴蘗豉等藥

右件藥依時收採以貯藏之蟲豸之藥不收採也

秤斗升合鐵臼木臼絹羅紗羅馬尾羅刀砧玉槌瓷鉢大小銅銚鐺釜銅鐵匙等

右合藥所須極當預備

凡藥皆不欲數數曬曝多見風日氣力即薄歇宜熟知之諸藥未即用者候天大晴時於烈日中曝令大乾以新瓷器貯之泥頭密封須用開取即急封之勿令中風濕之氣雖經年亦如新也其丸散以瓷器貯密蠟封之勿令洩氣則三十年不壞諸杏人及子等藥瓷器貯之則鼠不能得

柰法皆須去地三四尺則土濕之氣不中也

重刊孫真人備急千金要方卷之一

重刊孫眞人備急千金要方卷之二 婦人方上

求子第一

論六首 方一十五首 灸法六首 轉女爲男法三首

論曰夫婦人之別有方者以其胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四已上陰氣浮溢百想經心內傷五臟外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論生熟二藏虛實交錯惡血內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或瘡痍未愈便合陰陽或便利於懸廁之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣爲病虛實冷熱爲患者故與丈夫同也惟懷胎妊而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜欲多於丈夫感病倍於男

子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所以為病根深療之難瘥故養生之家特須教子女學習此三卷婦人方令其精曉即於倉卒之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機産育者婦人性命之長務若不通明於此則何以免於夭枉者哉故傅母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不虞也

論曰人之情性皆願賢己而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日憒爾若愚是則徒願賢己而疾不及人之謬也斯實不達賢己之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉

論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并本命不在子休廢死墓中者則求子必得若其本命五行相剋及與刑殺衝破并在子休廢死墓中者則求子了不可得愼無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳禁忌法受胎時日推王相貴宿日法在二十七卷中

論曰凡人無子當是爲夫妻俱有五勞七傷虛羸百病所致故有絕嗣之患夫治之之法男服七子散女服紫石門冬圓及坐藥盪胞湯無不有子也

七子散 治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方

五味子　鍾乳粉　牡荊子　菟絲子　車前子

菥蓂子　石斛　乾地黃　薯蕷　杜仲

鹿茸　遠志各捌銖　附子　蛇床子　菖蒲各陸銖

山茱萸　天雄　人參　茯苓　黃耆

牛膝各伍銖　桂心拾銖　蓯蓉拾壹銖　巴戟天拾貳銖

右二十四味治下篩酒服方寸匕日二不知增至三匕以知為度禁如藥法不能酒者蜜和圓服亦得一方加覆盆子八銖求子法一依後房中篇

朴消盪胞湯治婦人立身已來全不産及斷緒久不産三十年者方

朴消　牡丹　當歸　大黃　桃人生用各叁銖

細辛　厚朴　桔梗　人參　赤芍藥

茯苓　桂心　甘草　牛膝　橘皮各貳銖

附子陸銖　䗪蟲　水蛭各拾枚

右十八味㕮咀以清酒五升水五升合煑取三升分四服日三夜一每服相去三時更服如常覆被取少汗汗不出冬日著火籠之必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮內有此惡物使然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥千金翼不用桔梗甘草

治全不産及斷緒服前朴消湯後著坐導藥方

皂莢　山茱萸千金翼作苦瓠　當歸各壹兩

細辛　五味子　乾薑各貳兩　大黃

礬石　戎鹽　蜀椒各半兩

右十味為末以絹袋盛大如指長三寸盛藥令滿內婦人陰中坐卧任意勿行走急小便時去之更安新者一日一度必下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若未見病出亦可至十日安之　一本別有葶藶砒霜各半兩此藥為服朴消湯恐去冷惡物出不盡以導藥下之值天陰冷不疼不須著導藥亦有著鹽為導藥者然不如此藥其服朴消湯後即安導藥經一日外服紫石門冬丸

紫石門冬圓治全不產及斷緒方

紫石英　天門冬各三兩　當歸　芎藭
紫葳　卷柏　桂心　烏頭　乾地黃
牡蒙千金翼作牡荊外臺作牡蒙　禹餘粮　石斛　辛夷各貳兩

人參　桑寄生　續斷　細辛　厚朴
乾薑　食茱萸　牡丹　牛膝各叁拾銖　柏子人壹兩
署預　烏賊骨　甘草各壹兩半
右二十六味爲末蜜和丸如梧桐子大酒服十丸日三
漸增至三十丸以腹中熱爲度不禁房室夫行不在不
可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有娠

白薇圓主令婦人有子方

白薇　細辛　防風　人參　秦椒
白斂一云白芷　桂心　牛膝　秦艽　蕪荑
沙參　芍藥　五味子　白殭蠶　牡丹
蠐螬各壹兩　乾漆　柏子人　乾薑　卷柏
附子　芎藭各叁拾銖　桃人　紫石英各壹兩半

鍾乳　乾地黃　白石英各貳兩　鼠婦半兩
水蛭　䗪蟲各拾伍枚　吳茱萸拾捌銖
麻布叩幞頭壹尺燒
右二十一味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日再稍加至三十丸當有所去小覺有異即停服

又方

治久無子或斷緒上熱下冷百病皆治之方
白薇　乾地黃　乾薑　車前子　蜀椒各拾捌銖
紫石英　藁本　石膏　菴䕡子　卷柏各拾參銖
澤蘭　赤石脂　白龍骨　遠志　麥門冬
茯苓　太乙餘粮各貳兩　當歸　芎藭
蛇牀子各壹兩　白芷　覆盆子　桃人
人參各壹兩半　桂心　蒲黃各貳兩半　細辛參兩　橘皮半兩

右二十八味爲末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日再漸增以知爲度亦可至五十丸慎猪雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛肉等覺有娠即停三月正擇食時可食牛肝及心至四月五月不須但不可故殺令子短壽遇得者大良

金城太守白薇圓治月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日有子方

白薇　細辛各叄拾銖　人參　杜衡古今錄驗用牡蠣

牡蒙　厚朴　半夏　白殭蠶　當歸

紫菀各拾捌銖　牛膝　沙參　乾薑　秦艽各半

蜀椒　附子　防風各壹兩半

右十七味爲末蜜和丸如梧子大先食服三丸不知稍

增至四五丸此藥不可長服覺有娠即止用之大驗崔氏有桔梗丹參拾捌銖

論曰古者求子多用慶雲散承澤圓今代人絕不用此雖不試驗其法可重故述之

慶雲散 治丈夫陽氣不足不能施化施化無成方

覆盆子 五味子各壹升 菟絲子貳升 天雄壹兩 石斛 白朮各叁兩 桑寄生肆兩 天門冬玖兩 紫石英貳兩

右九味治下篩酒服方寸匕先食服日三素不耐冷者去寄生加細辛四兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔十五枚

承澤圓 治婦人下焦三十六疾不孕絕產方

梅核人 辛夷各壹升 葛上亭長柒枚

溲疏 叁兩　藁本 壹兩　澤蘭子 伍合

右六味爲末蜜和丸如大豆先食服二丸日三不知稍增若腹中無堅癖積聚者去葶藶加通草一兩惡寒者和藥先以苦酒搜散乃內少蜜和爲丸

大黃圓 治帶下百病無子服藥十日下血二十日下長蟲及青黃汁三十日病除五十日肥白方

大黃 破如米豆熬令黑　柴胡　朴消　乾薑 各壹
芎藭 伍兩　蜀椒 貳兩　茯苓 如雞子大壹枚

右七味爲末蜜和丸如梧桐子大先食服七丸米飲下加至十丸以知爲度五日微下

吉祥圓 治女人積年不孕方

天麻　桺絮　牡丹　茯苓　乾地黃

桂心各壹兩 五味子 桃花 白朮 芎藭各貳兩
覆盆子壹斗 桃人壹伯枚 菟絲子 褚實子各壹升
右十四味爲末蜜和丸如豆大每服空心飲苦酒下五
丸日中一服晚一服
消石大黃圓 治十二瘕癖及婦人帶下絕產無子并服寒
食藥而腹中有癖者當先服大丸下之乃服寒食藥大丸
不下水穀但下病耳不至令人虛極方見第十一卷中
秦椒圓 治婦人絕產生來未產盪滌腑臟使玉門受子精
秦椒 天雄各拾捌銖 玄參 人參 白斂
鼠婦 白芷 黃耆 桔梗 露蜂房
白殭蠶 桃人 蠐螬 白薇 細辛
蕪荑各壹兩 牡蒙 沙參 防風 甘草

牡丹皮　牛膝　卷栢　五味子　芎藭

桂心　大黃　石斛　白朮各叁拾銖　栢子人

茯苓　當歸　乾薑各壹兩半　澤蘭　乾地黃

芎藭各壹兩拾捌銖　乾漆　白石英　紫石英

附子各貳兩　鍾乳貳兩半　水蛭柒拾枚　麻布叩複頭柒尺燒

䗪蟲佰枚

右四十四味爲末蜜丸如梧子酒服十丸日再稍加至二十丸若有所去如豆汁鼻涕此是病出覺有異即停

灸法

婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸婦人絕嗣不生胞門閉塞灸關元三十壯報之

婦人姙子不成若墮落腹痛漏見赤灸胞門五十壯在關

元左邊二寸是也右邊二寸名子戶
婦人絕嗣不生灸氣門穴在關元傍三寸各百壯
婦人子藏閉塞不受精疼灸胞門五十壯
婦人絕嗣不生漏赤白灸泉門十壯三報穴在橫骨當陰上際

論曰陰陽調和二氣相感陽施陰化是以有娠而三陰所會則多生女但妊娠二月名曰始膏精氣成於胞裏至於三月名曰始胎血脈不流象形而變未有定儀見物而化是時男女未分故未滿三月者可服藥方術轉之令生男也

丹參圓 治婦人始覺有娠養胎并轉女爲男方

丹參 續斷 芍藥 白膠 白朮

柏子人 甘草各貳兩 人參 芎藭 乾薑各叁拾銖

吳茱萸 橘皮 當歸各壹兩拾捌銖 白芷

冠纓燒灰各壹兩 乾地黃壹兩半 蕪荑拾捌銖

犬卵壹具乾 東門上雄雞頭壹枚

右十九味爲末蜜和丸如梧子大酒服十丸日再稍加

至二十丸

又方 取原蠶屎一作矢一枚井花水服之日三

又方 取弓弩弦一枚絳囊盛帶婦人左臂一法以繫腰下

滿百日去之

又方 取雄黃一兩絳囊盛帶之要女者帶雌黃

又方 以斧一柄於產婦卧床下置之仍繫刃向下勿令人

知如不信者待雞抱卵時依此置於窠下一窠兒子

盡爲雄也

妊娠惡阻第二 論一首 方四首 法二首

論曰何以知婦人妊娠脉平而虛者乳子法也經云陰搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脉動甚者妊子也少陰心脉也心主血脉又腎名胞門子戶尺中腎脉也尺中之脉按之不絕法妊娠也三部脉沈浮正等按之無絕者有娠也

妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也

妊娠四月欲知男女者左疾爲男右疾爲女左右俱疾爲產二子又法左手沈實爲男右手浮大爲女左右手俱沈實猥生二男俱浮大猥生二女尺脉若左偏大爲男右偏大爲女左右俱大產二子大者如實狀又法左手尺中浮

大者男右手尺中沈細者女若來而斷絕者月水不利又法左右尺俱浮爲產二男不然女作男生俱沈爲產二女不爾男作女生又法得太陰脉爲男得太陽脉爲女太陰脉沈太陽脉浮又遣妊娠人面南行還復呼之左廻首者是男右廻首者是女又看上圊時夫從後急呼之左廻首是男右廻首是女又婦人妊娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女

妊娠欲知將產者懷妊離經其脉浮設腹痛引腰脊爲今出也但離經者不病也又法欲生其脉離經夜半覺痛日中則生也

論曰凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有淡水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月

水尚來顏色肌膚如常但苦沈重憒悶不欲食飲又不知其患所在脉理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憒憒頭重眼眩四肢沈重懈惰不欲執作惡聞食氣欲噉鹹酸果實多卧少起世謂惡食其至三四月日已上皆大劇吐逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於藏藏氣不宣通故心煩憒悶氣逆而嘔吐也血脉不通經絡否澁則四肢沈重挾風則頭目眩也覺如此候者便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸淡水消除便欲食也既得食力體強氣盛力足養胎母便健矣古今治阻病方有十數首不問虛實冷熱長少殆死者活於此方

半夏茯苓湯

治妊娠阻病心中憒悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩重四肢

百節疼煩流重多臥少起惡寒汗出疲極黃瘦方

半夏　生薑各叄拾銖　乾地黃　茯苓各拾捌銖

橘皮　旋復花　細辛　人參

芍藥　芎藭　桔梗　甘草各拾貳銖

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母各十二銖若變冷下痢者去乾地黃入桂心十二銖若食少胃中虛生熱大便閟塞小便赤少者宜加大黃十八銖去地黃加黃芩六銖餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱增損方調定更服一劑湯便急服茯苓丸令能食便強健也忌生冷醋滑油膩菘菜海藻

茯苓圓 治姙娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂弱不自勝持服之即効要先服半夏茯苓湯兩劑後可服此方

茯苓　人參　桂心熬　乾薑　半夏

橘皮各壹兩　白朮　葛根　甘草　枳實各貳兩

右十味為末蜜和為丸如梧子飲服二十丸漸加至三十丸日三一月後不用乾薑半夏橘皮白朮葛根只五味又云姙娠忌桂故熬

治姙娠惡阻嘔吐不下食方

青竹茹　橘皮各拾捌銖　茯苓　生薑各壹兩　半夏叄拾銖

右五味㕮咀以水六升煑取二升半分三服不瘥頻作

又方 治姙娠嘔吐不下食方

橘皮　竹茹　人參

白朮各拾捌銖 生薑陸兩 厚朴拾貳銖

右六味㕮咀以水七升煑取二升半分三服不瘥重作

養胎第三 論二首 禁忌一首 方三十三首 逐月養胎二十首

論曰舊説凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鐘鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和情性節嗜慾庶事清淨生子皆良長壽忠孝仁義聰慧無疾斯蓋文王胎教者也

論曰兒在胎日月未滿陰陽未備腑臟骨節皆未成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

妊娠食羊肝令子多厄食山羊肉令子多病

妊娠食驢馬肉令子延月食騾肉產難

妊娠食兎肉犬肉令子無音聲并缺[illegible]

妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

妊娠食雞肉糯米令子[illegible]寸白蟲

妊娠食椹并鴨子令子倒出[illegible]寒

妊娠食雀肉并豆醬令子滿面多野䵟黑子

妊娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥

妊娠食鼈令子項短

妊娠食冰漿絕胎

妊娠勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才逐月養胎方

妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥毋食腥

是謂才正

妊娠一月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行否澀不爲力事寢必安靜無令恐畏

妊娠一月陰陽新合爲胎寒多爲痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服

烏雌雞湯方

烏雌雞一隻治如食法　茯苓　阿膠各貳兩

吳茱萸壹升　麥門冬伍合　人參　芍藥

白朮各叁兩　甘草　生薑各壹兩

右十味㕮咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煎取三升內酒三升并膠烊盡取三升放溫每服一升

日三

補胎湯 若曾傷一月胎者當預服此方

細辛壹兩　防風貳兩　乾地黃　白朮各叁兩

生薑肆兩　吳茱萸　大麥各伍合　烏梅壹升

右八味㕮咀以水七升煑取二升半分三服先食服寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加栝蔞根二兩若有所思去大麥加柏子人三合一方有人參一兩

妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百節皆痛是為胎始結

妊娠二月足少陽脉養不可鍼灸其經足少陽內屬於膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也

妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風

寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍

熱常服艾葉湯方

艾葉　丹參　當歸　麻黃各貳兩　人參

阿膠各叁兩　甘草壹兩　生薑陸兩　大棗拾貳枚

右九味㕮咀以酒三升水一斗煑減半去滓内膠煎取三升分三服一方用烏雌雞一隻宿肥者治如食法割頭取血内三升酒中相和汔以水一斗二升先煑取汁去雞内藥煎取三升内血酒并膠煎取三升分溫三服

黃連湯 若曾傷二月胎者當預服此方

黃連　人參各壹兩　吳茱萸伍合

生薑叁兩　生地黃伍兩一方用阿膠

右五味㕮咀以酢漿七升煑取三升分四服日三夜一

十日一修合若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用

漿直用水耳　一方用當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

妊娠三月手心主脉養不可針灸其經手心主內屬於心無悲哀思慮驚動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦痛或腰背卒有所下雄雞湯方

雄雞壹隻治如食法　黃芩　白朮　生薑各壹兩

麥門冬伍合　芍藥肆兩　大棗拾貳枚擘　甘草

人參　茯苓　阿膠各貳兩

右十一味㕮咀以水一斗三升煑雞減半出雞內藥煑取半內清酒三升并膠煎取三升分三服一日令盡當溫臥一方用當歸芎各二兩不用黃芩生薑

茯神湯　若曾傷三月胎者當預服此方

茯神　丹參　龍骨各壹兩　阿膠　當歸

甘草　人參各貳兩　大棗貳拾壹枚　赤小豆貳拾壹粒

右九味㕮咀以酢漿一斗煑取三升分四服先食服七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩深師有薤白二兩麻子一升

妊娠四月始受水精以成血脈食宜稻粳羮宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而行經絡

妊娠四月手少陽脈養不可鍼灸其經手少陽內輸三焦

四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

妊娠四月有寒心下愠愠欲嘔胷膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下若急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胷心煩不得安卒有所下

菊花湯方

菊花如雞子大壹枚 麥門冬壹升 大棗拾貳枚 人參壹兩半 甘草 當歸各貳兩 麻黃 阿膠各叁兩 半夏肆兩 生薑伍兩

右十味㕮咀以水八升煮減半内清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫卧當汗以粉粉之護風寒四五日一方用烏雌雞一隻煮水煎藥

調中湯 若曾傷四月胎者當預服此方

白芍藥 生薑各肆兩 厚朴 生李根白皮

枳實　白朮　柴胡各叁兩　續斷

芎藭　甘草各壹兩　當歸壹兩半　烏梅壹升

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

八日後復服一劑

姙娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五臟

姙娠五月足太陰脉養不可針灸其經足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大飢無甚飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦

姙娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒

有所下阿膠湯主之之方

阿膠肆兩 人參壹兩 生薑陸兩 當歸 芍藥

甘草 黃芩各貳兩 旋覆花貳合 吳茱萸柒合 麥門冬壹升

右十味㕮咀以水九升煑藥減半內清酒三升并膠微火煎取三升半分四服日三夜一先食服便愈不瘥再服一方用烏雌雞一隻割取咽血內酒中以水煑雞以煎藥減半內酒并膠煎取三升半分四服

安中湯曾傷五月胎者當預服此方

黃芩壹兩 當歸 芎藭 乾地黃

人參各貳兩 甘草 芍藥各參兩 生薑陸兩

麥門冬壹升 五味子 大麻人伍合 大棗參拾伍枚

右十二味㕮咀以水七升清酒五升煑取三升半分四

服日三夜一、七日復服一劑

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理紉筋以養其力以堅背膂

妊娠六月足陽明脉養不可針灸其經足陽明内屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無太飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹内脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服麥門冬湯方

麥門冬壹升　人參　甘草　黃芩各貳兩

乾地黃叁兩　阿膠肆兩　生薑陸兩　大棗拾伍枚

右八味以水七升煑減半内清酒二升并膠煎取三升分三服中間進糜粥一方用烏雌雞一隻煑水以煎藥

柴胡湯 若曾傷六月胎者當預服此方
柴胡肆兩 茯苓壹兩 白朮 芍藥一作紫葳 甘草
麥門冬 芎藭貳兩 生薑陸兩 乾地黃伍兩 大棗參拾枚

右十味㕮咀以水一斗煑取三升分四服日三夜一中間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑

姙娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻粳以密腠理是謂養骨而堅齒

姙娠七月手太陰脉養不可針灸其經手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

姙娠八月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若傷

寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強葱白湯主之方

葱白長三四寸拾肆莖　半夏　麥門冬各壹升

旋復花貳合　黃芩壹兩　人參壹兩半　甘草

當歸　黃耆各叁兩　阿膠肆兩　生薑捌兩

右十一味㕮咀以水八升煮減半內清酒三升及膠煮取四升每服一升日三夜一溫臥當汗出若不出者加麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強責汗一方以黃雌雞一隻割咽取血內酒中煮雞取汁以煎藥

杏仁湯若曾傷七月胎者當預服此方

杏人　甘草各貳兩　紫菀壹兩　鍾乳　乾薑各叁兩

麥門冬　吳茱萸各壹升　粳米伍合　五味子叁合

右九味㕮咀以水八升煮取三升半分四服日三夜一

中間進食七日服一劑一方用白雞一隻煑汁煎藥

姙娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色

姙娠八月手陽明脉養不可針灸其經手陽明內屬於大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輙失食無忍大起

姙娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目䀮䀮**芍藥湯**主之之方

芍藥　生薑各肆兩　厚朴貳兩　甘草

當歸　白朮　人參各叁兩　薤白切壹升

右八味㕮咀以水五升清酒四升合煑取三升分三服

一日再夜一一方用烏雌雞煮汁以煎藥

葵子湯 若曾傷八月胎者當預服此方

葵子貳升 甘草 厚朴各貳兩 白朮

柴胡各叁兩 芍藥肆兩 生薑陸兩 大棗貳拾枚

右八味㕮咀以水九升煮取三升分三服日三凡十日一劑一方用烏雌雞一隻煮水以煎藥

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力

妊娠九月足少陰脈養不可針灸其經足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒脈續縷皆成無處濕冷無著炙衣

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛不可轉側短氣**半夏湯**方

半夏　麥門冬　吳茱萸　當歸
阿膠各三兩　乾薑壹兩　大棗拾貳枚
右七味㕮咀以水九升煑取三升去滓內白蜜八合微火上溫服四服痢即止一方用烏雌雞一隻煑汁煎藥

豬腎湯 治曾傷九月胎者當預服此方
豬腎壹具　茯苓　桑寄生　乾薑　乾地黃　芎藭各三兩　白朮肆兩　附子中者一枚　大豆三合　麥門冬壹升
右十味㕮咀以水一斗煑腎令熟去腎內諸藥煎取三升半分四服日三夜一凡十日更一劑

姙娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神皆備但俟時而生
姙娠一月始胚二月始膏三月始胞四月形體成五月能

動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月諸神備日滿即産矣宜服滑胎藥入月即服

丹參膏 養胎臨月服令滑而易產方

丹參半斤　芎藭　當歸各貳兩　蜀椒伍合有熱者以大麻人伍合代

右四味㕮咀以清酒溲濕停一宿以成煎猪膏四升微火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日取如棗許内酒中服之不可逆服至臨月乃可服舊用常驗

甘草散 令易生母無疾病未生一月日預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺方

甘草壹兩　黃芩一用茯苓　乾薑　吳茱萸　大豆黃卷

麻子人　桂心　大麥蘗各叁兩　一方用粳米

右八味治下篩酒服方寸匕日三暖水服亦得

千金圓主養胎治産難顛倒胞不出服一丸傷毀不下産餘病汗不出煩滿不止氣逆滿以酒服一丸一名保生丸

甘草　貝母　秦椒　大豆黃卷

乾薑　桂心　黃芩　粳米一作糯米

石斛　石膏各陸銖　當歸拾貳銖　麻子參合

右十二味爲末蜜和丸如彈子大每服一丸日三用棗湯下一方用蒲黃一兩

蒸大黃圓治妊娠養胎令易産方

大黃參拾銖熬　枳實　芎藭　白朮　杏人各拾捌銖

芍藥　乾薑　厚朴各拾貳銖　吳茱萸壹兩

右九味爲末蜜丸如梧桐子大空腹酒下二丸日三不知稍加之

滑胎令易產方

阿膠捌兩　滑石叁兩　車前子壹升

右三味，治下篩，飲服方寸匕，日再，至生月乃服，藥利九竅，不可先服。

妊娠諸病第四　此篇有十章　灸法三首　方八十九首

第一　胎動及數墮胎　方六六首　灸法一首

治妊娠二三月上至八九月胎動不安，腰痛，已有所見方。

艾葉　阿膠　芎藭肘後不用　當歸各叁兩　甘草貳兩

右五味，以水八升，煮取三升，去滓，內膠令消，分三服，日三。

治妊娠胎動，去血，腰腹痛方。

阿膠貳兩　芎藭　當歸　青竹茹各伍兩

右四味，以水一斗半，煮銀二斤，取六升，去銀，內藥，煎取

二升半內膠令烊分三服不瘥重作一方用甘草二兩

葱白湯 治妊娠胎動不安腹痛方

葱白切壹升 阿膠貳兩 當歸 續斷 芎藭各叁兩

右五味㕮咀以水一斗先煮銀六七兩取七升去銀內藥煎取二升半下膠令烊分三服不瘥重作

治妊娠胎動晝夜叫呼口噤唇搴及下重痢不息方

艾葉㕮咀以好酒五升煮取四升去滓更煎取一升服口閉者格口灌之藥下即瘥亦治妊娠腰痛及妊娠熱病并妊娠卒下血

旋覆花湯 治妊娠六七月胎不安常服之方

旋覆花壹兩 半夏 芍藥 生薑各貳兩 枳實 厚朴 白朮 黃芩 茯苓各叁兩

右九味㕮咀以水一斗煑取二升半分五服日三夜一先食服

治妊娠數墮胎方

取赤小豆爲末酒服方寸匕日三亦治妊娠數月月水尚來者

又方 妊娠三月灸膝下一寸七壯

第二 漏胞方四首

治妊娠下血如故名曰漏胞胞乾便死方

生地黃半斤㕮咀以清酒二升煑三沸絞去滓服之無時能多服佳（姚大夫加黃雌雞一頭治如食法崔氏取雞血和藥中服）

治妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方

乾地黃擣末以三指撮許酒服不過三服瘥

又方　生地黃汁一升清酒四合煮三四沸頓服不止頻服

又方　乾薑貳兩　乾地黃肆兩

右二味治下篩以酒服方寸匕日再三服

第三子煩方三首

竹瀝湯　治妊娠常苦煩悶此是子煩

竹瀝壹升　麥門冬　防風　黃芩各參兩　茯苓肆兩

右五味以水四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥再作

又方　時時服竹瀝隨多少取瘥止

第四心腹腰痛及脹滿方二十首

治妊娠心痛方

青竹皮一升以酒二升煮三兩沸頓服之

又方　破生雞子一枚酒和服之

又方 白蜜參兩 羊脂捌兩 青竹茹壹升

右三味合煎食頃服如棗核大三枚日三

又方 蜜一升和井底泥泥心下

又方 燒棗二七枚為末家服之立愈

治姙娠腹中痛方

生地黃三斤擣絞取汁用清酒一升合煎減半頓服

又方 燒車釭脂内酒中服亦治姙娠欬嗽并產難三日不出

又方 取蜜一升頓服良

治姙娠腹中㽲痛叉心不得飲食方

黃芩參兩 芍藥肆兩 白朮陸兩

右三味㕮咀以水六升煮取三升分三服半日令藥盡

微下水令易生月飲一劑為善

治姙娠忽苦心腹痛方

燒鹽令赤熱三指撮許酒服之立產

治姙娠傷胎結血心腹[illegible]

取小兒尿二升頓服之[illegible]大良

治姙娠中惡心腹痛方

新生雞子二枚破著杯中以糯米粉和如粥頓服亦

治姙娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止

又方

水三升洗夫靴剔汁溫服

治姙娠中蠱心腹痛方

燒敗鼓皮酒服方寸匕須臾自呼蠱主姓名

治姙娠腰痛方
大豆二升以酒三升煑取二升頓服之亦治常人卒
腰痛者
又方 麻子三升以水五升煑取汁三升分五服亦治心痛
又方 豉貳兩 楡白皮叁兩
右二味熟擣蜜丸如梧桐子大服二七丸亦治心痛
又方 燒牛屎焦末水服方寸匕日三服
又方 地黃汁八合酒五合合煎分溫服
治姙娠脹滿方
取秤鎚燒之淬酒中服良亦治姙娠卒下血
第五傷寒方一十六首
治姙娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼方

石膏捌兩　大青　黃芩各叁兩　葱白切壹升
前胡　知母　梔子人各肆兩
右七味㕮咀以水七升煑取二升半去滓分五服相去
如人行七八里又再服
治妊娠頭痛壯熱心煩嘔吐不下食方
知母肆兩　粳米伍合　生蘆根壹升　青竹茹叁兩
右四味以水五升煑取二升半稍稍飲之盡更作瘥止
治妊娠傷寒服湯後頭痛壯熱不歇宜用此湯拭其身
麻黃半斤　竹葉切壹升　石膏叁升爲末
右三味以水五升煑取一升去滓冷用拭身體又以故
布搶頭額胷心燥則易之患瘥者加恒山五兩
治妊娠傷寒方

葱白拾莖　生薑貳兩切

右二味以水三升煮取一升半頓服取汗

治妊娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸方

鯽魚一頭燒作灰擣末酒服方寸匕取汗

治妊娠遭時疾令子不落方

取竈中黃土水和塗臍乾復塗之一方酒和塗方五寸又泔清和塗之並佳

又方　大豕泥塗腹勿令乾

治妊娠熱病方

葱白伍兩　豆豉壹升

右二味以水六升煮取二升分二服取汗

又方　葱白一把以水三升煮令熟服之取汗食葱令盡亦

主安胎若胎已死者須臾即出

【又方】車轄脂酒服大良【又方】井底泥泥心下三寸立愈

【又方】青羊屎塗腹上【又方】水服伏龍肝一雞子大

治大熱煩悶者方

葛根汁二升分三服如人行五里又進一服

【又方】燒大棗七枚為末酒和服

【又方】擣簣燒灰取方寸匕酒和服

第六瘧病方二首

治妊娠患瘧湯方

恒山貳兩 甘草壹兩 黃芩參兩 烏梅拾肆枚 石膏捌兩

右五味㕮咀以酒水各一升半合漬藥一宿煮三四沸

去滓初服六合次服四合後服二合凡三服

【又方】恬山　竹葉各叁兩　石膏捌兩
粳米壹伯粒崔氏外臺作糯米集驗救急作秫米一
右四味㕮咀以水六升煮取一升半去滓分三服第一服取未發前一食頃服之第二服取臨欲發服之餘一服用以塗頭額及胸前五心藥滓置頭邊當一日勿近水及進飲食過發後乃進粥食

【第七】下血方十一首

治妊娠忽暴下血數升胎燥不動方
榆白皮叁兩　當歸　生薑各貳兩
乾地黃肆兩　葵子壹升肘後不用
右五味以水五升煮取二升半分三服不瘥更作服之

【集驗】治妊娠卒驚奔走或從高墮下暴出血數升方

馬通汁壹升 乾地黃 阿膠各肆兩 當歸 艾葉各參兩

右五味㕮咀以水五升煑取二升半去滓内馬通汁及膠令烊分三服不瘥重作

膠艾湯 治妊娠二三月上至七八月其人頓仆失踞胎動不下傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣方

艾葉三兩 阿膠 芎藭 芍藥 甘草 當歸各貳兩 乾地黃肆兩

右七味㕮咀以水五升好酒三升合煑取三升去滓内膠更上火令盡消分三服日三不瘥更作

治妊娠卒下血方

葵子一升以水五升煑取二升分三服瘥止

又方 生地黃切一升以酒五升煑取三升分三服亦治落

身後血

又方 取葵根莖燒作灰以酒服方寸匕日三

蟹爪湯 治姙娠僵仆失據胎動轉上搶心甚者血從口出逆不得息或注下血一斗五升胎不出子死則寒熨人腹中急如產狀虛乏少氣困頓欲死煩悶反覆服藥母得即安下血亦止其當產者立生方

蟹爪壹升 甘草 桂心各貳尺 阿膠貳兩

右四味㕮咀以東流水一斗煑取三升去滓內膠烊盡能爲一服佳不能者食頃再服若口急不能飲者格口灌之藥下便活也與母俱生若胎已死獨母活也若不僵仆平安姙娠無有所見下血服此湯即止或云桂不安胎亦未必爾

治姙娠胎墮下血不止方

丹參十二兩㕮咀以清酒五升煑取三升分三服温日三

又方 地黄汁和代赭爲末服方寸匕

又方 桑蝎蟲屎燒灰酒服方寸匕

香豉湯 治半產下血不盡苦來去煩滿欲死方

香豉一升半以水三升煑三沸漉去滓内成末鹿角一方寸匕頓服之須臾血自下鹿角燒亦得

第八小便病方十五首 灸法一首

治姙娠小便不利方

葵子壹升 榆白皮壹把切

右二味以水五升煑五沸每服一升日三

又方 葵子 茯苓各一兩

右二味爲末以水服方寸匕日三小便利則止（仲景云妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩）

治妊娠患子淋方

葵子一升以水三升煮取二升分再服

又方 葵根一把以水三升煮取二升分再服

治妊娠小便不通利方

蕪菁子七合爲末水和服方寸匕日三

治妊娠尿血方

黍穰燒灰酒服方寸匕日三

治婦人無故尿血方

龍骨五兩治下篩酒服方寸匕空腹服日三久者二

十服愈

又方 爪甲 亂髮

右二味並燒末等分酒服方寸匕日三 飲服亦得

又方 桂心 鹿角骨 大豆黃卷各壹兩

右三味治下篩酒服方寸匕日三

又方 取夫爪甲燒作灰酒服之

又方 取故舡上竹茹曝乾擣末酒服方寸匕日三 亦主遺尿

治婦人遺尿不知出時方

白薇 芍藥各壹兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方 礬石 牡蠣各貳兩

右二味治下篩酒服方寸匕亦治丈夫

又方 胡燕窠中草燒末酒服半錢匕亦治丈夫

又方 燒道死人薦草灰服之瘥

又方 灸横骨當陰門七壯

第九下痢方八首 灸法一首

治妊娠下痢方

人參 黃芩 酸石榴皮各叄兩

欅皮肆兩 粳米叄合

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

又方 白楊皮一斤㕮咀以水一大升煮取二小升分三服

又方 燒中衣帶二寸爲末服之

又方 羊脂如碁子大十枚溫酒一升投中頓服之日三

治妊娠患膿血赤滯魚腦白滯臍腹絞痛不可忍者方

薤白切壹升　酸石榴皮　黃蘗各叁兩崔寶作黃連

阿膠貳兩　地榆肆兩

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服不瘥更作

治妊娠注下不止方

阿膠　艾葉　酸石榴皮各貳兩

右三味以水七升煮取二升去滓內膠令烊分三服

治妊娠及產已寒熱下痢方

黃連壹升　黃蘗壹斤　梔子叁拾枚

右三味㕮咀以水五升漬一宿煮三沸服一升一日一夜令盡嘔者加橘皮一兩生薑二兩亦治丈夫常痢

治婦人欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行方

石榴皮 麴各捌兩 黃蘗一作黃檗 烏梅 黃連

艾各壹兩 防已貳兩 阿膠 乾薑各叁兩 附子伍兩

右十味為末，蜜和丸如梧子大，飲服二十丸，日三，漸加至三十四十丸。

治婦人水泄痢方

灸氣海百壯，三報。

第十 水腫方五十首

治妊娠體腫有水氣，心腹急滿湯方

茯苓 白朮各四兩，崔氏無朮 黃芩 杏人各叁兩 旋復花貳兩

右五味，㕮咀，以水六升，煮取二升半，分三服。

鯉魚湯 治妊娠腹大，胎間有水氣方

鯉魚壹頭貳斤　白朮　生薑各伍兩

芍藥　當歸各叁兩　茯苓肆兩

右六味㕮咀以水一斗二升先煮魚熟澄清取八升內藥煎取三升分五服

治妊娠毒腫方

蕪菁根淨洗去皮擣酢和如薄泥勿令有汁猛火煮二三沸適性薄腫以帛急裹之日再易寒時溫覆非根時用子若腫在咽中取汁含咽之

又方　燒犢牛屎酢和傅之乾則易亦可服方寸匕日三

治妊娠手脚皆腫攣急方

赤小豆伍升　商陸根壹斤切

右二味以水三斗煮取一斗稍稍飲之盡更作一方加

澤漆一斤

産難第五 論一首八條 方二十一首 針法一首

論曰産婦雖是穢惡然將痛之時及未産已産並不得令死喪汚穢家人來視之則生難若已産者則傷兒也

婦人産乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水血惡物著物則殺人及浣濯衣水皆以器盛過此忌月乃止

凡生産不依産圖脱有犯觸於後母子皆死若不至死即母子俱病庶事皆不稱心若能依圖無所犯觸母即無病子亦易養

凡欲産時特忌多人瞻視惟得二三人在傍待總産訖乃可告語諸人也若人衆看視無不難産

凡産婦第一不得怱怱忙怕傍人極須穩審皆不得預緩預急及憂惶憂惶則難産若腹痛眼中火生此兒廻轉未即生也　兒出訖一切人及母皆忌問是男是女兒始落地與新汲井水五咽忌與暖湯物勿令母看視穢汚

凡産婦慎食熱藥熱麪食常識此飲食當如人肌温温也

凡欲臨産時必先脫尋常所著衣以籠竈頭及竈口令至密即易産也

凡産難及子死腹中并逆生與胞胎不出諸篇方可通撿用之

治産難或半生或胎不下或子死腹中或著脊及坐草數日不産血氣上搶心母面無顔色氣欲絶者方

淳酒貳升　白蜜　成煎猪膏各壹升

右三味合煎取一升分再服不能再服可隨所能服之

治產後惡血不除上搶心痛煩急者以地黄汁代醇酒

治難產三方

槐枝切貳升　榆白皮切　大麻人各壹升

瞿麥　通草各叁兩　牛膝伍兩

右六味㕮咀以水一斗二升煮取三升半分五服

又方　吞皂莢子二枚

又方　取厠前已用草二七枚燒作屑水調服之

又方　令夫唾婦口中二七過立出

又方　針兩肩井入一寸寫之須臾即分免

治產難三日不出方

取鼠頭燒作屑井花水服方寸匕日三

又方　車軸脂吞大豆許兩丸

又方　燒藥杵令赤內酒中飲之

又方　燒大刀鐶以酒一杯沃之頓服即出救死不分免者

治產難累日氣力乏盡不能得生此是宿有病者方

阿膠 貳兩　赤小豆 貳升

右二味以水九升煮豆令熟去滓內膠令烊每服五合不覺更服不過三服即出

又方　槐子 拾肆枚　蒲黃 壹合

右二味合內酒中溫服須臾不生再服之水服亦得

又方　生薑汁　生地黃汁 各半升

右二味合煎熟頓服之

治產難及日月未足而欲產者方

知母一兩爲末蜜丸如兎屎大每服一丸痛不止更一丸

羚羊角散 治産後心悶是血氣上衝心所致

羚羊角一枚燒作灰下篩以東流水服方寸匕若未瘥須臾再服取悶瘥乃止

又方 羖羊角燒作灰以温酒服方寸匕不瘥須臾再進（備急）

方以治産難

治産乳運絶方

半夏一兩擣篩丸如大豆内鼻孔中即愈（此是扁鵲法）

又方 神麴末水服方寸匕亦治産難

又方 赤小豆擣爲散取東流水服方寸匕不瘥更服

又方 含釅醋潠面即愈凡悶即潠之

又方　取釅醋和産血如棗許大服之

治心悶方

産後心悶眼不得開即當頂上取髪如兩指大強以人牽之眼即開

子死腹中第六　論一首　方十七首

論曰凡婦人産難死生之候母面赤舌青者兒死母活母脣口青口兩邊沫出者母子俱死母面青舌赤口中沫出者母死子活

治動胎及産難子死腹中并妊娠兩兒一死一生服之令死者出生者安神驗方

蟹爪壹升　甘草貳尺　阿膠參兩

右三味以東流水一斗先煑蟹爪甘草得三升去滓次

內膠令烊頓服之不能分再服若人困拗口內藥藥入即活煎藥作東向竈用葦薪煑之

眞珠湯治胎死腹中方

熟眞珠壹兩　榆白皮切壹升

右二味以苦酒三升煑取一升頓服之死胎立出

治子死腹中不出方

以牛屎塗母腹上立出

又方取竈下黃土三指撮以酒服之立出土當著兒頭上亦治逆生及橫生不出手足先見者

又方服水銀三兩立出

又方取夫尿二升煑令沸飲之

又方酢二升拗口開灌之

又方呑槐子二七枚亦治逆生

又方三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升合

煑令產婦東向飲之立出

又方 瞿麥一斤以水八升煑取二升一服一升不出再服

治胎死腹中乾燥著背方

葵子壹升 阿膠伍兩

右二味以水五升煑取二升頓服之未出再煑服

治姙娠未足月而胎卒死不出其母欲死方

以苦酒濃煑大豆每服一升死胎立出不能頓服分再服一方用醇酒煑大豆亦治積聚成瘕

治姙娠胎死腹中若子生胞衣不出腹中引腰背痛方

甘草壹尺 筒桂肆寸 雞子壹枚 蒲黃貳合 香豉貳升

右以水六升煑取一升頓服之胎胞穢惡盡去大良

治姙娠得病須去胎方

以雞子一枚鹽三指撮和服立下（此與阮河南療難產同）

又方　麥蘖一升爲末和蜜一升服之立下

又方　七月七日神麴三升酢一升煑兩沸宿不食平旦頓服之即下

又方　大麥麴五升酒一斗煑三沸去滓分五服令盡當宿勿食其子如麋令母肥盛無疾苦千金不傳

逆生第七（論一首　方十四首）

論曰凡産難或兒橫生側生或手足先出可以針錐刺兒手足入一二分許兒得痛驚轉即縮自當廻順也

治逆生方

以鹽塗兒足底又可急爪搔之并以鹽摩産婦腹上即愈

又方　以鹽和粉塗兒足下即順子母秘錄云以鹽和胡粉

又方　取梁上塵如彈丸許二枚治末三指撮溫酒服之

治逆生及橫生不出手足先見者方

燒蛇蛻皮爲末服一刀圭一方云三指撮面向東酒服即順

又方　取蟬殼二枚治爲末三指撮許溫酒服之崔氏外臺子母秘錄作彈丸二枚爲末酒服

又方　取夫陰毛二七莖燒以猪膏和丸如大豆吞之兒手即持丸出神驗

又方　取蛇蛻皮燒灰猪膏和丸東向服

又方　以手中指取釜底墨交畫兒足下即順生

又方　取父名書兒足下即順生

治橫生及足先出者方

取梁上塵竈突墨酒服之

【又方】取車釭中脂書兒脚下及掌中

治縱橫生不可出者方

菟絲子末酒若米汁服方寸匕即生車前子亦好服如上法

【又方】以水苦酒服竈突黑塵

治產時子但趨穀道者方

熬鹽熨之自止

胞胎不出第八　方二十五首

【牛膝湯】治產兒胞衣不出令胞爛方

牛膝　瞿麥各壹兩　滑石貳兩一方用桂心貳兩

當歸　通草各壹兩半　葵子半升

右六味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治産難胞衣不出橫倒者及兒死腹中母氣欲絶方

半夏　白斂各貳兩

右二味治下篩服方寸匕小難一服橫生二服倒生三服兒死四服亦可加代赭瞿麥各二兩爲佳

治胎死腹中若母病欲下之方

取榆白皮細切煮汁三升服之即下難生者亦佳

又方　生地黄汁一升苦酒三合令暖服之不能頓服分再服亦得

又方　牛膝叁兩　葵子壹升

右二味以水七升煮取三升分三服

又方　澤蘭葉叁兩　滑石伍合　生麻油貳合

右三味以水一升半煮澤蘭取七合去滓内滑石麻油

頓服之

治胞衣不出方

取小麥合小豆煮令濃飲其汁立出亦治橫逆生者

又方 取瓜瓣二七枚服之立出良

又方 取水煮弓弩弦飲五合即出亦可燒灰酒和服

又方 取宅中所埋柱掘出取坎底當柱下土大如雞子酒和服之良

又方 墨三寸爲末酒服

又方 取蒲黄如棗許以井花水服

又方 苦酒服真珠一兩

又方 雞子一枚苦酒一合和飲之

又方 生男吞小豆七枚生女者十四枚即出

治逆生胎不出方

竈屋上墨以酒煮一兩沸取汁服

治產後胞不時出方

井底土如雞子中黃以井花水和服立出

又方 取井中黃土丸如梧桐子吞之立出又治兒不出

治子死腹中若衣不出欲上搶心方

急取蟻蛭土三升熬令熱囊盛熨心下令胎不得上搶心良

又方 末竈突中墨三指撮許以水苦酒調服立出當著兒頭生

又方 取夫內衣蓋井上立出 又方 取炊蔽當戶前燒服之

下乳第九 方二十一首

鍾乳湯 治婦人乳無汁方

石鍾乳　消石（一方用滑石）　白石脂各陸銖

通草拾貳銖　桔梗半兩切

右五味㕮咀以水五升煑三沸三上三下去滓內消石令烊分服

又方

石鍾乳　通草各等分

右二味爲末粥飲服方寸匕日三後可兼養兩兒（通草橫心者是勿取羊桃根色黃無益）一方二味酒五升漬一宿明旦煑沸去滓服一升日三夏冷服冬溫服

又方

石鍾乳肆兩　甘草貳兩（一不用）　漏蘆叁兩　通草　栝蔞根伍兩

右五味㕮咀以水一斗煑取三升分三服（一云用栝蔞實一枚）

又方

石鍾乳　通草各壹兩　漏蘆半兩

桂心　甘草　栝蔞根各陸銖

右六味治下篩酒服方寸匕日三最驗

又方 石鍾乳 漏蘆各貳兩

右二味治下篩飲服方寸匕即下

漏蘆湯 治同前

漏蘆 通草各貳兩 石鍾乳壹兩 黍米壹升

右四味㕮咀米宿漬揩撻取汁三升煑藥三沸去滓作飲飲之日三

漏蘆散 治同前

漏蘆半兩 石鍾乳 栝蔞根各壹兩 蠐螬叁合

右四味治下篩先食糖水服方寸匕日三

單行石膏湯 治同前

石膏四兩研以水二升煑三沸稍稍服一日令盡

乳無汁

麥門冬散治同前

麥門冬　通草　理石　石鍾乳

右四味各等分治下篩先食酒服方寸匕日三

又方　麥門冬　通草　理石　石鍾乳

土瓜根　大棗　蠐螬

右七味等分治下篩食畢用酒服方寸匕日三

又方　母豬蹄一具粗切以水二斗煮得五六升汁飲之不出更作

又方　豬蹄貳枚熟炙槌碎　通草捌兩細切

右二味以清酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作外臺豬蹄不炙以水壹斗煮取四升入酒肆升更煮飲之

又方　栝蔞根切一升酒四升煮三沸去滓分三服

又方 栝蔞根 漏蘆各叁兩 石鍾乳肆兩
白頭翁壹兩 滑石 通草各貳兩
右六味治下篩以酒服方寸匕日三
又方 取栝蔞子尚青色大者一枚熟擣以白酒一斗煑取
四升去滓溫服一升日三黄色小者用二枚亦好
又方 土瓜根治下篩服半錢匕日三乳如流水
單行鬼箭湯 治同前
鬼箭五兩以水六升煑取四升每服八合日三亦可
燒作灰水服方寸匕日三
甘草散 治同前
甘草壹兩 通草叁拾銖 石鍾乳貳拾銖
雲母貳兩半 屋上散草貳把燒爲灰

右五味治下篩食後溫漏蘆湯服方寸匕日三乳下止

又方 燒死鼠作屑酒服方寸匕日三立下勿令知

又方 燒鯉魚頭爲末酒服三指撮

鯽魚湯 下乳汁方

鯽魚長七寸 猪肪半斤 漏蘆 石鍾乳各八兩

右四味切猪肪魚不須洗治清酒一斗二升合煑魚熟藥成絞去滓適寒溫分五服其間相去須臾一飲令藥力相及爲佳乳即下